Turdidae
Mirlos o tordos

Turdidae

- Cerca de 300 especies
- 15 spp en CR
- Presentes en todo el mundo excepto Nueva Zelanda y algunas islas oceánicas.
- Presentan melodías complejas o de flujo continuo.
- Llegaron al Neotrópico a través de Norteamérica.
- Los mirlos del Nuevo Mundo tienen coloración sencilla con tonos cafés, grises, rufos y negros.
- Sexos similares
- Hay gran variedad de técnicas de forrajeo y dietas. Muchas comen bastantes frutos, otros son insectívoros.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Jilguero

- https://www.youtube.com/watch?v=71K3u_BgyQM

Video

- https://www.facebook.com/vidrios.sarapiqui/videos/pcb.1015634927926286 9/9732978495204 23/?type=3&theater

Mimidae

- Sinsontes, cenzontles o burlones
- Muchos de ellos son capaces de imitar los sonidos de otros animales.

Mimus gilvus, pajaro imitador tropical


Groenlandia
Islandia
Finlandia
Suecia
Noruega
Rusia
Reino Unido
Canadá
Polonia
Alemania
Ucrania
Kazajistán
Mongolia
Francia
Italia
España
Estados Unidos
Pacífico Norte
Atlántico Norte
Turquía
China
Corea del Sur
Japón
Irak
Irán
Afganistán
Pakistán
Argelia
Libia
Egipto
Arabia Saudita
India
Tailandia
México
Mali
Níger
Chad
Sudán
Nigeria
Etiopía
Venezuela
Colombia
Kenia
Tanzania
Indonesia
Papúa Nueva Guinea
Perú
Brasil
Bolivia
Angola
Namibia
Botsuana
Madagascar
Océano Índico
Australia
Chile
Pacífico Sur
Atlántico Sur
Sudáfrica
Argentina
Nueva Zelanda
Océano Antártico
Océano Antártico
ANTÁRTIDA

Bombycillidae

- *Bombicylla cedrorum*, Ampelis americano

Ptilogonatidae

- *Ptilogonys caudatus,* capulinero

Estrildidae

- *Lonchura malacca,* Monjita tricolor


Ártico
Ártico
Ártico
Groenlandia
Islandia
Finlandia
Suecia
Noruega
Rusia
Reino Unido
Polonia
Alemania
Ucrania
Francia
Italia
España
Kazajistán
Mongolia
Canadá
Estados Unidos
Pacífico Norte
Atlántico Norte
Turquía
China
Corea del Sur
Japón
Irak
Irán
Afganistán
Pakistán
India
Tailandia
Argelia
Libia
Egipto
Arabia Saudita
México
Mali
Níger
Chad
Sudán
Nigeria
Etiopía
Venezuela
Colombia
Kenia
Tanzania
Indonesia
Papúa Nueva Guinea
Brasil
Perú
Bolivia
Angola
Namibia
Botsuana
Madagascar
Océano Índico
Australia
Chile
Pacífico Sur
Atlántico Sur
Sudáfrica
Argentina
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
Pacífico Norte
Pacífico Sur
Océano Antártico
Océano Antártico
Océano Antártico
ANTÁRTIDA
Datos de mapas ©2020
500 km
Términos

Passeridae

- *Passer domesticus*, gorrión común


Groenlandia
Islandia
Finlandia
Suecia
Noruega
Reino Unido
Polonia
Alemania
Ucrania
Francia
Italia
España
Turquía
Rusia
Kazajistán
Mongolia
China
Corea del Sur
Japón
Canadá
Estados Unidos
México
Atlántico Norte
Pacífico Norte
Argelia
Libia
Egipto
Irak
Irán
Afganistán
Pakistán
Arabia Saudita
India
Tailandia
Mali
Níger
Chad
Sudán
Nigeria
Etiopía
Kenia
Tanzania
Angola
Namibia
Botsuana
Sudáfrica
Madagascar
Indonesia
Papúa Nueva Guinea
Australia
Nueva Zelanda
Venezuela
Colombia
Perú
Brasil
Bolivia
Chile
Argentina
Pacífico Sur
Atlántico Sur
Océano Índico
Océano Antártico
ANTÁRTIDA

Para leer

- https://es.wikipedia.org/wiki/Exterminio_de_gorriones_en_China

Fringillidae (12 spp)

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11
12
13

Passerellidae (26 spp)

- Saltones, pinzones, chingolos, juncos

Juan D Astorga

Zeledoniidae

Zeledonia coronata, Zeledonia

© Luis Vargas

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Icteridae

- Bolseros, oropéndolas, tordos, vaqueros, zacateros y parientes.
- Cerca de 90 especies restringidas a los continentes e islas del hemisferio occidental.
- La mayoría residentes, especies norteñas tienden a migrar.
- Miden entre 15 y 56 cm, picos cónicos y puntiagudos. Patas y dedos gruesos y fuertes.
- A menudo sexos semejantes en trópico, pero pueden diferir en coloración y tamaño.
- Muchos anidan en colonias, nidos tejidos largos y colgantes. Hembras construyen nidos.
- Comen insectos, frutos, animales pequeños, néctar. Algunos bastante omnívoros.
- Las especies de vaqueros son parásitos de cría y no construyen nido.

10b
9
7c
8
7a
7b
10a
11
12
13a
14a
15
13b
14b

Zanates

http://www.youtube.com/watch?v=aFGdMbuToQY

Julián Zule
www.apiatierradeaves.co

Icteridae

Parulidae (Reinitas)

- Cerca de 110 especies, restringidas a Nuevo Mundo.
- 50 spp en CR
- Casi todas las especies del Norte migran a los trópicos en fuera de época de cría.
- La mayoría de las especies que viven en trópicos viven en las montañas.
- Predomina el amarillo.
- La mayor parte son insectívoras, algunas varían su dieta con frutas y nectar.

© Luboš Mráz
www.naturfoto.cz

Edgar Mendez

1a
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a


10b
10a
9
11b
11a
13a
12
13b
14a
14b
15a
16

Cardinalidae (20 spp)

- Pico cónico
- Se alimentan muchos de semillas.
- Algunos migratorios y otros residentes.

©2010 Mike Danzenbaker

Thraupidae
(49 spp en Costa Rica)

Tangaras y mieleros
Familia Thraupidae

- La mayoría habita en los trópicos. Hay 230 especies.
- Se alimentan principalmente de frutos y semillas.
- Es una familia muy colorida.
- En muchos machos y hembras son similares, en otros el macho es más colorido.

1a
2a
3a
4a
5
6
7a
7b
8
9
10a
10b
11
12
13a
13b
14a
14b
15

1a
2a
3a
4a
5
6
7a
7b
8
9
10a
10b
11
12
13a
13b
14a
14b
15

1b
2b
3b
4b
1a
2a
3a
4a
5
6
7a
7b
8
9
10a
10b
11
12
13a
13b

Edgar Méndez.